

# Arzneimitteltabelle für antiretrovirale Substanzen

HIV-Medikamente

Medikamente mit Zulassung in der Schweiz (2018)

Generischer Name	Markenname	Form	Standarddosis für Erwachsene	Tabl./ Tag	Relevante Nebenwirkungen	Einnahme mit/ohne/ vor Mahlzeit (MZ)
<b>Nukleosidische/nukleotidische Reverse-Transkriptase-Hemmer (NRTI/NtRTI)</b>						
<b>3TC, Lamivudin</b>	3TC (Generikum: Lamivudin Teva)	 Tabletten: 150 mg, 300 mg	150 mg, 2 x/d <b>oder</b> 300 mg, 1 x/d	<b>2</b> 1	Kopfschmerzen, Durchfall, Erbrechen, Hautausschlag, Polyneuropathie	egal
<b>Abacavir (ABC)</b>	Ziagen	 Tabletten: 300 mg	300 mg, 2 x/d <b>oder</b> 600 mg, 1 x/d	<b>2</b> 1	Überempfindlichkeitsreaktionen, Erbrechen, Kopfschmerzen, Übelkeit, Durchfall, Appetitlosigkeit, Hautausschlag	egal
<b>AZT, Zidovudin</b>	Retrovir AZT	 Kapseln: 250 mg	250 mg, 2 x/d	<b>2</b>	Blutbildveränderungen, Übelkeit, Erbrechen, Bauch- schmerzen, Durchfall, Störungen der Leberfunktion, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Schwindel, Unwohlsein, Lipodystrophie, Laktatazidose	egal
<b>Emtricitabin (FTC)</b>	Emtriva	 Kapseln: 200 mg	200 mg, 1 x/d	<b>1</b>	Kopfschmerzen, Durchfall, Übelkeit, Hautausschlag, Juckreiz	egal
<b>Tenofovir alafenamid (TAF)</b>	Nur als Kombi- nationspräpa- rat erhältlich	Tabletten: mit 10 mg, 25 mg	1 Tbl, 1 x/d	<b>1</b>	Wie TDF, aber weniger belastend für Niere und Knochen	egal
<b>Tenofovir disoproxil (TDF)</b>	Viread	 Tabletten: 245 mg	245 mg, 1 x/d	<b>1</b>	Nierenschäden, Osteoporose, Durchfall, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen, Blähungen, Kopfschmerzen	mit MZ
<b>Nicht-nukleosidische Reverse-Transkriptase-Hemmer (NNRTI)</b>						
<b>Efavirenz (EFV)</b>	Stocrin	 Tabletten: 600 mg; Kapseln: 200 mg	600 mg, 1 x/d	<b>1</b>	Schlafstörungen, Alpträume, Depressionen, Konzentrationschwäche, Schwindel, Übelkeit, Durchfall, Anstieg der Leber- und Cholesterinwerte, Hautausschläge	besser verträgl. nüchtern, vorm Schlafen
<b>Etravirin (ETV)</b>	Intence	 Tabletten: 100 mg, 200 mg	200 mg, 2 x/d	<b>2</b>	Hautausschläge, Durchfall, Übelkeit, Bauch- schmerzen, Erbrechen, Sodbrennen, Blähungen, Magenschleimhautentzündung, Erschöpfung, Kribbeln oder Schmerzen in Händen oder Füßen	besser verträgl. mit MZ
<b>Nevirapin (NVP)</b>	Viramune Retard	 Tabletten: 400 mg	400 mg, 1 x täglich nach 2-wöchiger Einleitungsphase mit der halben Dosierung	<b>1</b>	Hautausschläge, Leberveränderungen, Blutbild- veränderungen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Magenschmerzen, Schläfrigkeit	egal
<b>Rilpivirin (RPV)</b>	Edurant*	 Tabletten: 25 mg	25 mg, 1 x/d	<b>1</b>	Veränderungen bei einem Leberwert (Transaminase), Einschlafschwierigkeiten, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit	mit MZ
<b>Proteasehemmer (PI)</b>						
<b>Atazanavir (ATV)</b>	Reyataz	 Kapseln: 150 mg, 200 mg und 300 mg	300 mg + 100 mg RTV, 1 x/d	<b>2</b>	Übelkeit, Gelbsucht, Durchfall, Kopfschmerzen, Magen-/Darmbeschwerden, Erbrechen, Haut- ausschlag und -rötung, Anstieg Cholesterin	besser verträgl. mit MZ
<b>Darunavir (DRV)</b>	Prezista	 Tabletten: 400 mg, 600 mg und 800 mg	800 mg + 100 mg RTV, 1 x/d <b>oder</b> 600 mg + 100 mg RTV, 2 x/d	<b>2-4</b>	Bauchschmerzen, Durchfall, Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Hautausschlag, Anstieg Cholesterin	mit MZ
<b>Lopinavir/ Ritonavir (LPV/RTV)</b>	Kaletra	 Tabletten: 200 mg LPV und 50 mg RTV <b>oder</b> 100 mg LPV und 25 mg RTV	2 Tbl 2 x/d <b>oder</b> 4 Tbl 1 x/d	<b>4</b>	Bauchschmerzen, abnormaler Stuhl und Durchfall, Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen, Anstieg Cholesterin	egal
<b>Booster</b>						
<b>Cobicistat (Cobi)</b>	Tybost	 Tabletten: 150 mg	zur Verstärkung («Boosten») anderer Proteasehemmer (PI): 150 mg	<b>1</b>	Übelkeit, Gelbsucht, Anstieg Blutzucker, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Durchfall, Schlafstörungen, Alpträume	mit MZ
<b>Ritonavir (RTV)</b>	Norvir	 Tabletten: 100 mg	zur Verstärkung («Boosten») anderer Proteasehemmer (PI): 100 mg - 200 mg	<b>1-2</b>	Anstieg Cholesterin, Anstieg Leberwerte, Magen-Darm-Beschwerden	mit MZ

\* Edurant ist beim Schweizerischen Heilmittelinstitut zugelassen, aber es ist noch nicht kassenpflichtig. Daher wird Edurant nicht automatisch von den Krankenkassen bezahlt. Eine Rücksprache mit Ihrer Krankenkasse vorab ist wichtig. Fragen Sie dazu Ihren Arzt.

Generischer Name	Markenname	Form	Standarddosis für Erwachsene	Tabl./ Tag	Relevante Nebenwirkungen	Einnahme mit/ohne/ vor Mahlzeit (MZ)	
<b>CCR5-Hemmer</b>							
<b>Maraviroc (MVC)</b>	<i>Celsentri</i>		Tabletten: 150 mg, 300 mg	300 mg, 2 x/d <b>oder</b> 150 mg, 2 x/d mit geboosteten Pls <b>oder</b> 600 mg, 2 x/d mit EFV oder ETV	<b>2 – 4</b>	Bauchschmerzen, Durchfall, Muskelentzündungen, Ein- und Durchschlafstörungen, depressive Störungen, Infektionen der oberen Atemwege, Husten	egal
<b>Integrasehemmer</b>							
<b>Dolutegravir (DTG)</b>	<i>Tivicay</i>		Tabletten: 50 mg	1 Tbl, 1 x/d (ausser bei Integrase-Inhibitor-Resistenz, 1 Tbl 2 x/d)	<b>1 (– 2)</b>	Kopfschmerzen, Durchfall, Übelkeit, Hautausschlag, Juckreiz, Erbrechen, Schmerzen im Oberbauch, Schlafstörungen, Schwindelgefühl, abnormes Träumen, Depression, ungeeignet für Frauen mit Kinderwunsch	egal
<b>Elvitegravir/ Cobicistat (EVG/Cobi)</b>	<i>Nur als Kombinationspräparat erhältlich</i>		Tabletten: mit 150 mg EVG und 150 mg Cobi	1 Tbl, 1 x/d	<b>1</b>	Übelkeit, Durchfall, abnormes Träumen, Kopfschmerzen	mit MZ
<b>Raltegravir (RAL)</b>	<i>Isetress</i>		Tabletten: 400 mg, 600 mg	400 mg, 2 x/d <b>oder</b> 600 mg, 1 x/d	<b>2</b> <b>1</b>	Übelkeit, Durchfall, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Hautausschlag	egal
<b>Kombinationspräparate</b>							
<b>3TC/ABC</b>	<i>Kivexa</i>		Tabletten: mit 300 mg 3TC und 600 mg ABC	1 Tbl, 1 x/d	<b>1</b>	siehe 3TC und ABC	egal
<b>3TC/ABC/ AZT</b>	<i>Trizivir</i>		Tabletten: mit 150 mg 3TC, 300 mg ABC und 300 mg AZT	1 Tbl, 2 x/d	<b>2</b>	siehe 3TC, ABC und AZT	egal
<b>3TC/ABC/ DTG</b>	<i>Triumeq</i>		Tabletten: mit 300 mg 3TC, 600 mg ABC und 50 mg DTG	1 Tbl, 1 x/d	<b>1</b>	siehe 3TC, ABC und DTG	egal
<b>3TC/AZT</b>	<i>Combivir (Generikum: Lamivudin-Zidovudin Mepha)</i>		Tabletten: mit 150 mg 3TC und 300 mg AZT	1 Tbl, 2 x/d	<b>2</b>	siehe 3TC und AZT	egal
<b>FTC/TAF</b>	<i>Descovy</i>	 	Tabletten: mit 200 mg FTC und 10 mg oder 25 mg TAF	1 Tbl, 1 x/d	<b>1</b>	siehe FTC und TAF	egal
<b>FTC/TAF/ RPV</b>	<i>Odefsey</i>		Tabletten: mit 200 mg FTC, 25 mg TAF und 25 mg RPV	1 Tbl, 1 x/d	<b>1</b>	siehe FTC, TAF und RPV	mit MZ
<b>FTC/TAF/ EVG/Cobi</b>	<i>Genvoya</i>		Tabletten: mit 200 mg FTC, 10 mg TAF, 150 mg EVG und 150 mg Cobi	1 Tbl, 1 x/d	<b>1</b>	siehe FTC, TAF, EVG und Cobi	mit MZ
<b>FTC/TDF</b>	<i>Truvada</i>		Tabletten: mit 200 mg FTC und 245 mg TDF	1 Tbl, 1 x/d	<b>1</b>	siehe FTC und TDF	mit MZ
<b>FTC/TDF/ EFV</b>	<i>Atripla</i>		Tabletten: mit 200 mg FTC und 245 mg TDF und 600 mg EFV	1 Tbl, 1 x/d	<b>1</b>	siehe FTC, TDF und EFV	nüchtern
<b>FTC/TDF/ RPV</b>	<i>Eviplera</i>		Tabletten: mit 200 mg FTC, 245 mg TDF und 25 mg RPV	1 Tbl, 1 x/d	<b>1</b>	siehe FTC, TDF und RPV	mit MZ
<b>FTC/TDF/ EVG/Cobi</b>	<i>Stribild</i>		Tabletten: mit 200 mg FTC, 245 mg TDF, 150 mg EVG, 150 mg Cobi	1 Tbl, 1 x/d	<b>1</b>	siehe FTC, TDF, EVG und Cobi	mit MZ

Die vorliegende Tabelle wurde mit aller gebotenen Sorgfalt erstellt. Alle Angaben sind immer in Zusammenhang mit dem entsprechenden ärztlichen Rat zu verwenden.

Die Tabelle enthält nur eine begrenzte Auswahl der Information über die antiretroviralen Substanzen. Zur kompletten Beschreibung der Medikamente (Nebenwirkungen usw.) fragen Sie Ihren Arzt, lesen Sie die Packungsbeilage oder gehen Sie auf die Website [www.swissmedinfo.ch](http://www.swissmedinfo.ch).

Die Tabelle finden Sie zum Herunterladen auf [www.shop.aids.ch/hivpos](http://www.shop.aids.ch/hivpos).

5., aktualisierte Auflage 2018 (online verfügbar) D/F



AIDS-HILFE SCHWEIZ  
AIDE SUISSE CONTRE LE SIDA  
AIUTO AIDS SVIZZERO

Aids-Hilfe Schweiz  
Stauffacherstrasse 101, Postfach 9870, 8036 Zürich  
[www.aids.ch](http://www.aids.ch)

Spendenkonto  
Zürich, Postkonto 30-10900-5